

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Навършена възраст:	Имунизация против:	Ваксина:	Начин на приложение
През първите 24 часа след раждането	Имунизация против хепатит Б (I прием)	Моновалентна хепатит Б ваксина <u>Engerix B</u>	мускулно, 0,5 мл
От 48-ия час след раждането	Имунизация против туберкулоза	<u>БЦЖ</u>	вътрекожно, 0,1 мл
Втори месец	Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепати Б (I прием) Имунизация против пневмококи (I прием)	Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б <u>Hexacima</u> или <u>Infanrix hexa</u> Конюгирана пневмококова ваксина <u>Synflorix</u>	мускулно, 0,5 мл
Трети месец	Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (II прием)	Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б <u>Hexacima</u> или <u>Infanrix hexa</u>	мускулно, 0,5 мл
Четвърти месец	Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепати Б (III прием) Имунизация против пневмококи (II прием)	Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б <u>Hexacima</u> или <u>Infanrix hexa</u> Конюгирана пневмококова ваксина <u>Synflorix</u>	мускулно, 0,5 мл
Седми месец	Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави <u>проба Манту</u> (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират	<u>БЦЖ</u>	вътрекожно, 0,1 мл
Дванадесет месеца	Реимунизация против пневмококи (не по-рано от 6 месеца след прилагане на втория прием)	Конюгирана пневмококова ваксина <u>Synflorix</u>	мускулно, 0,5 мл
Тринадесет месеца	Имунизация против морбили, паротит и рубеола	Триваксина морбили – паротит – рубеола <u>M-M-RVAXPRO</u>	подкожно или мускулно, 0,5 мл

Навършена възраст:	Имунизация против:	Ваксина:	Начин на приложение
Шестнадесет месеца	Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (не по-рано от една година след III прием)	Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б <u>Pentaxim</u> или <u>Infanrix-IPV+Hib</u>	мускулно, 0,5 мл
Шест години	Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием)	Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина <u>Tetraxim</u>	мускулно, 0,5 мл
Седем години	Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна <u>проба Манту</u>)	<u>БЦЖ</u>	вътрекожно, 0,1 мл
Дванадесет години	Реимунизация против морбили паротит и рубеола Реимунизация против тетанус, дифтерия и коклюш (VI прием)	Триваксина морбили – паротит – рубеола <u>M-M-RVAXPRO</u> Комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание (Тдка) <u>Boostrix</u>	подкожно или мускулно, 0,5 мл мускулно, 0,5 мл
Седемнадесет години	Реимунизация против тетанус и дифтерия	<u>ТД</u>	мускулно, 0,5 мл
От 25-ата година през 10 години	Реимунизация против тетанус и дифтерия	<u>ТД</u>	мускулно, 0,5 мл

Ваксинациите след шестгодишна възраст се провеждат в календарната година на навършване на възрастта.